

Не употребляй алкоголь во время беременности

Алкоголь может навредить плоду

**Расстройство фетального
алкогольного спектра
(FASD, Fetal Alcohol
Spectrum Disorders) –
термин, охватывающий
широкий диапазон
нарушений плода.
Разновидности FASD:**

FAS – фетальный алкогольный синдром или алкогольный синдром плода

PFAS – частичные проявления фетального алкогольного синдрома

ARND – нарушения нервно-психического развития, вызванные алкоголем

ARBD – врождённые дефекты, вызванные алкоголем.

Ребёнку помогут правильное распознавание синдрома, реабилитация и поддержка на различных жизненных этапах.



Kehitysvamma-
liitto

3-Й ТРИМЕСТР (25–40 НЕДЕЛЯ)

Продолжается развитие ЦНС и легких. Плод приобретает свой конечный внешний вид. Плод быстро развивается и прибавляет свой вес. Алкоголь может повлиять на внешний вид плода, темпы его роста и развитие ЦНС.

1-Й ТРИМЕСТР (1–12 НЕДЕЛЯ)

Формируются внутренние органы (первыми мозг и сердце), развиваются ручки, ножки и глаза, а также начинает биться сердце. Алкоголь может вызвать нарушения работы органов и ЦНС.

Алкоголь опасен для плода на всех стадиях беременности

2-Й ТРИМЕСТР (13–24 НЕДЕЛЯ)

Все органы уже практически сформировались, продолжают развиваться глаза, ЦНС, легкие и наружные половые органы. Начинают формироваться черты лица.

Алкоголь может повлиять на зрение и слух плода, темпы его роста и вызвать нарушения ЦНС.